

別表第二（第一条関係）

区分等	番号	条	件	区分等該当可能性
非該当	1	生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 応用日常生活動作 = 0.0 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） = 0.0 かつ 金銭の管理 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	62.2%
	2	応用日常生活動作 = 0.0 かつ 関節の拘縮 肩関節 = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（B群） = 0.0 かつ 特別な医療 = 0.0 かつ 片足での立位保持 = 0.0 かつ 集中力が続かない = 0.0	82.4%
—	3	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≥ 0.1 かつ 行動上の障害（B群） = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	64.0%
	4	生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 2.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 13.0 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 金銭の管理 ≥ 1.4 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	80.4%
	5	生活機能Ⅱ = 0.0 かつ 二軸評価 能力障害 ≤ 2.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≥ 0.1 かつ 行動上の障害（B群） ≥ 0.1 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	66.1%
	6	生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 二軸評価 能力障害 ≤ 3.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 13.0 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 金銭の管理 ≥ 1.4 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	61.3%
	7	生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 応用日常生活動作 ≤ 13.0 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≥ 0.1 かつ 金銭の管理 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	61.1%
	8	起居動作 ≥ 0.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	50.9%
	9	起居動作 = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 12.4	かつ 生活機能Ⅰ ≤ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ = 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≥ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≤ 20.1 かつ 感情が不安定 = 0.0	62.6%
	10	起居動作 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≥ 23.7 かつ 麻痺 ≤ 2.9	50.0%
	11	生活機能Ⅱ = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≥ 0.1 かつ 行動上の障害（B群） ≥ 0.1 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 意欲が乏しい = 0.0 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 3.0	47.4%
	12	生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≥ 0.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 13.0 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） = 0.0 かつ 金銭の管理 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	42.1%
	13	起居動作 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 23.6 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 生活障害評価 金銭管理 ≥ 4.0	64.0%
	14	生活機能Ⅱ ≥ 0.1 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 認知機能 ≤ 10.7 かつ 行動上の障害（A群） ≥ 0.1 かつ 行動上の障害（A群） ≤ 14.1	59.1%
	15	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 ≥ 9.1	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 23.6 かつ 生活障害評価 金銭管理 ≤ 3.0	92.7%
	16	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 6.7 かつ 買い物 ≥ 7.9 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 23.6 かつ 生活障害評価 金銭管理 ≤ 3.0	88.9%
	17	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≤ 6.7 かつ 買い物 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 23.6 かつ 生活障害評価 金銭管理 ≤ 3.0	74.1%
	18	起居動作 = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≤ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ ≥ 6.8 かつ 日常の意思決定 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9 かつ 生活機能Ⅱ ≤ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≥ 13.1 かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 生活障害評価 金銭管理 ≤ 3.0	72.3%
	19	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 特別な医療 = 0.0 かつ 洗濯 = 7.0 かつ 生活障害評価 金銭管理 = 3.0	88.9%
	20	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 金銭の管理 = 1.4 かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0 かつ 生活障害評価 対人関係 = 2.0	96.6%
	21	入浴 = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0 かつ 生活障害評価 生活リズム = 0.0 かつ 生活障害評価 服薬管理 = 2.0	84.4%
	22	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 調理 = 9.4 かつ 感情が不安定 = 0.0 かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0 かつ 生活障害評価 生活リズム = 0.0	82.9%
	23	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 認知機能 ≥ 0.1 かつ 認知機能 ≤ 13.1 かつ 行動上の障害（A群） = 0.0 かつ 金銭の管理 = 1.4 かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0	87.0%

55	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≤ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 認知機能	≥ 10.8	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	43.5%
56	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≥ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ こだわり	≤ 50.6 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 20.5	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 32.7	74.3%
57	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≥ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ こだわり	≤ 50.6 ≥ 1.9	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 20.5	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 32.7	52.3%
58	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（C群）	≤ 15.5 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≥ 0.1 ≥ 11.4	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	48.5%
59	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≤ 23.5 ≤ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≥ 36.2 ≤ 3.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 51.6	かつ 認知機能	≥ 19.0	77.8%
60	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≤ 23.5 ≤ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≥ 51.7 ≤ 3.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≥ 19.0	70.5%
61	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 移乗	≤ 23.5 ≥ 6.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 片足での立位保持	≥ 36.2 ≤ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	67.2%
62	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≤ 23.5 ≤ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≥ 36.2 ≥ 4.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≥ 19.0	52.5%
63	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≤ 23.5 ≥ 0.1	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≥ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	95.9%
64	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≥ 1.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≤ 23.5 ≤ 38.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺・拘縮	≥ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	81.0%
65	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≥ 0.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≤ 23.5 ≤ 38.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺・拘縮	≥ 36.2 ≥ 0.1	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	75.4%
66	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≤ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≥ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	72.4%
67	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≤ 15.5 ≤ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≤ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≥ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 認知機能	≤ 18.9	49.1%
68	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 右上肢	= 3.0							80.0%
69	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 左上肢	= 3.0							80.0%
70	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 入浴	= 0.0	かつ 透析	= 0.2							84.8%
71	起き上がり	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 透析	= 0.2							90.9%
72	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 特別な医療	≥ 0.1	かつ 特別な医療	≤ 3.7	かつ 入浴	= 0.0					80.9%
73	生活機能Ⅱ かつ 交通手段の利用	≥ 0.1 = 18.9	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 19.5	かつ 視聴覚機能	≥ 10.7	かつ 視聴覚機能	≤ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≥ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 61.5	88.1%
74	交通手段の利用 かつ 関節の拘縮 その他	= 0.0 = 0.0	かつ 透析	= 0.2	かつ 関節の拘縮 肩関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 股関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 肘関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 膝関節	= 0.0	88.2%
75	生活機能Ⅱ かつ 金銭の管理	≥ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 20.2	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 32.7	50.0%
76	生活機能Ⅱ かつ 買い物	≥ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 20.2	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 32.7	55.6%
77	生活機能Ⅱ かつ 視力	≥ 0.1 ≥ 25.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 視力	≤ 19.5 ≤ 28.3	かつ 応用日常生活動作	≥ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≤ 61.5	かつ 認知機能	≥ 0.1	かつ 認知機能	≤ 13.1	82.5%

78	起居動作 = 0.0 かつ 行動上の障害 (C群) ≤ 24.7	かつ 生活機能 I ≥ 21.1 かつ 移乗 ≤ 6.6	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作 ≤ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 30.2	60.7%
79	生活機能 II = 0.0 かつ 意欲が乏しい = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群) ≥ 0.1	かつ 被害的・拒否的 = 2.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	50.0%
80	生活機能 II = 0.0 かつ 意欲が乏しい = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群) ≥ 0.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 反復的行動 = 6.7	57.1%
81	生活機能 II = 0.0 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1	かつ 行動上の障害 (B群) ≥ 0.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 意欲が乏しい = 0.0	51.9%
82	生活機能 II = 0.0 かつ 意欲が乏しい = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1 かつ 二軸評価 能力障害 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群) ≥ 0.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 支援の拒否 = 2.8	52.6%
83	生活機能 II ≥ 0.1 かつ 行動上の障害 (C群) ≤ 14.0	かつ 生活機能 II ≤ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 認知機能 ≤ 10.7 かつ 生活障害評価 金銭管理 = 3.0	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 14.1	80.0%
84	生活機能 II ≥ 0.1 かつ 行動上の障害 (C群) ≤ 14.0	かつ 生活機能 II ≤ 23.5 かつ 被害的・拒否的 = 1.9	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 認知機能 ≤ 10.7 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 14.1	100.0%
85	生活機能 II ≥ 0.1 かつ 行動上の障害 (C群) ≤ 14.0	かつ 生活機能 II ≤ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1 かつ 麻痺 ≤ 2.9	かつ 認知機能 ≤ 10.7 かつ 生活障害評価 服薬管理 = 4.0	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 14.1	60.0%
86	起居動作 ≥ 6.9	かつ 生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 16.7			76.9%
87	生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 16.8	かつ 不安定な行動 ≤ 2.3			56.3%
88	生活機能 I ≤ 21.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 移乗 ≥ 6.6		69.7%
89	起居動作 ≤ 6.8	かつ 生活機能 I ≥ 4.1	かつ 生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 16.7		59.7%
90	生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 32.8	かつ そう鬱状態 ≥ 12.3		58.5%
91	生活機能 I ≤ 21.0	かつ 生活機能 II ≥ 34.9	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 移乗 ≥ 6.6		47.0%
92	生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≤ 36.1	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 21.0	かつ 調理 ≥ 9.4	かつ 感情が不安定 ≥ 2.1		46.1%
93	生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 32.8	かつ そう鬱状態 = 0.0		34.3%
94	生活機能 I ≤ 21.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 14.1	かつ 排尿 ≥ 11.6	57.3%
95	生活機能 I ≥ 15.6	かつ 生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 20.1	かつ 麻痺・拘縮 ≥ 7.2	52.8%
96	生活機能 I ≤ 21.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 23.2	かつ 生活障害評価 社会的適応 = 0.0	50.0%
97	生活機能 II ≥ 0.1	かつ 生活機能 II ≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作 ≤ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 20.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 32.7	45.5%
98	生活機能 I ≥ 21.1	かつ 生活機能 II ≥ 34.9	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≤ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 30.2	かつ 移乗 ≤ 6.6	41.9%
99	生活機能 I ≤ 21.0 かつ 排尿 = 0.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 3.0	かつ 麻痺・拘縮 ≥ 8.8	93.8%
100	生活機能 I ≤ 21.0 かつ 排尿 = 0.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 3.0	かつ 麻痺・拘縮 ≤ 8.7	80.6%
101	生活機能 I ≥ 21.1 かつ 移乗 ≤ 6.6	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作 ≤ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 30.2	かつ 行動上の障害 (C群) ≥ 24.8	72.2%
102	生活機能 I ≤ 21.0 かつ 排尿 = 0.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 3.1	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 14.1	67.7%
103	生活機能 I ≤ 21.0 かつ 生活障害評価 社会的適応 = 0.0	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作 ≥ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群) ≥ 14.2	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 23.1	60.3%
104	生活機能 I ≥ 21.1 かつ 移乗 ≤ 6.6	かつ 生活機能 II ≥ 23.6	かつ 生活機能 II ≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作 ≤ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群) ≤ 30.2	かつ 行動上の障害 (C群) ≤ 24.7	52.5%

105	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 23.9	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 32.8	49.1%
106	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 暴言暴行	≧ 23.6 ≧ 2.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	62.5%
107	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 暴言暴行	≧ 32.8 = 0.0	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	51.6%
108	生活機能 I かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能 II かつ 口腔清潔	≧ 23.6 ≧ 6.9	かつ 生活機能 II	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	72.7%
109	生活機能 I かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能 II かつ 口腔清潔	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能 II	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	56.6%
110	排尿	= 0.0	かつ こだわり	= 2.6	かつ てんかん	≧ 1.0							45.5%
111	排便	= 0.0	かつ こだわり	= 2.6	かつ てんかん	≧ 1.0							44.0%
112	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害 (B群)	= 0.0	かつ 移動	= 5.8	かつ 排便	= 10.9			87.5%
113	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害 (B群)	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 麻痺 左下肢	≧ 2.0			81.1%
114	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害 (B群)	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 麻痺 右下肢	≧ 2.0			81.1%
115	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害 (B群)	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 関節の拘縮 その他	= 0.0			80.4%
116	生活機能 I	≧ 0.1	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 薬の管理	= 0.0	かつ 麻痺	= 8.2			90.9%
117	生活機能 I	≧ 0.1	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 調理	= 20.2	かつ 麻痺	= 8.2			85.3%
118	生活機能 I	≧ 0.1	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 認知機能	= 0.0	かつ 移乗	= 6.6	かつ 入浴	= 6.1	かつ 関節の拘縮 肩関節 右	= 0.0	87.1%
119	生活機能 I	≧ 0.1	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 認知機能	= 0.0	かつ 移乗	= 6.6	かつ 入浴	= 6.1	かつ 関節の拘縮 肩関節 左	= 0.0	87.1%
120	生活機能 I	≧ 0.1	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 調理	= 9.4	90.0%
121	起居動作	≦ 6.8	かつ 生活機能 I	≦ 4.0	かつ 生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 16.7	かつ 移乗	= 6.6	75.0%
122	生活機能 I かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≦ 3.4	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 片足での立位保持	≧ 2.8	83.0%
123	生活機能 I かつ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ 生活機能 I	≦ 22.4	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 7.1	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	82.0%
124	生活機能 II かつ 感情が不安定	≦ 23.5 ≧ 2.1	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 38.6	かつ 衣服の着脱	= 12.0	100.0%
125	生活機能 II かつ 集団への不適応	≦ 23.5 ≧ 5.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 38.6	かつ 感情が不安定	≧ 2.1	100.0%
126	生活機能 II かつ 麻痺	≧ 0.1 ≦ 2.9	かつ 生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 14.2	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 多飲水・過飲水	≧ 4.4	66.7%
127	生活機能 II かつ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≦ 5.0	かつ 生活機能 II かつ 麻痺	≦ 23.5 ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 14.2	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 落ち着きがない	≧ 4.4	83.3%
128	生活機能 I かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能 II かつ 関節の拘縮 その他	≧ 0.1 = 12.7	かつ 生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 8.4	57.1%
129	生活機能 I かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能 II かつ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ 生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 8.4	62.5%
130	生活機能 I かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 35.7 = 0.0	かつ 生活機能 II	≧ 41.2	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	53.8%
131	生活機能 I かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能 II かつ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≧ 4.4	かつ 生活機能 II かつ 落ち着きがない	≦ 23.5 ≦ 5.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 8.4	100.0%

	132	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 ≧ 2.8	かつ 生活機能 II かつ 衣服の着脱	≦ 50.6 = 12.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	55.6%
	133	生活機能 I かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能 I かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能 II かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≧ 11.4	かつ 生活機能 II かつ 関節の拘縮 その他	≦ 23.5 = 12.7	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	53.3%
	134	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 ≧ 2.8	かつ 生活機能 II かつ 支援の拒否	≦ 50.6 ≧ 2.8	かつ 応用日常生活動作 かつ 支援の拒否	≦ 73.2 ≦ 3.4	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	57.1%
	135	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 暴言暴行	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 落ち着きがない	≦ 32.7 ≧ 4.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 落ち着きがない	≦ 73.2 ≦ 5.0	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	75.0%
	136	生活機能 I かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能 I かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能 II かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≧ 11.4	かつ 生活機能 II かつ 支援の拒否	≦ 23.5 ≧ 2.8	かつ 応用日常生活動作 かつ 支援の拒否	≧ 36.2 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	75.0%
	137	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能 II かつ 落ち着きがない	≦ 50.6 ≧ 4.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 落ち着きがない	≦ 73.2 ≦ 5.0	かつ 認知機能 かつ こだわり	≦ 20.5 ≧ 1.9	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	75.0%
四	138	生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 16.8	かつ 不安定な行動	≧ 3.5					56.5%
	139	生活機能 I	≦ 37.5	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 74.0	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 45.1					50.9%
	140	生活機能 I	≧ 21.1	かつ 生活機能 I	≦ 40.3	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 30.3			52.8%
	141	生活機能 I	≧ 40.4	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 30.3	かつ 調理	≦ 9.4			46.5%
	142	生活機能 I	≦ 21.0	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 14.2	かつ 生活障害評価 社会的適応	≧ 2.0	62.6%
	143	生活機能 I	≧ 35.8	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≦ 6.6	61.3%
	144	生活機能 I	≧ 21.1	かつ 生活機能 I	≦ 34.5	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	55.0%
	145	生活機能 I かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 24.0	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 32.8	50.0%
	146	生活機能 I かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 21.1 ≧ 26.5	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	55.4%
	147	生活機能 I かつ 麻痺	≧ 37.6 ≦ 4.9	かつ 生活機能 I かつ 生活障害評価 社会的適応	≦ 59.9 ≦ 3.0	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 74.0	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 40.2	かつ 移乗	≦ 6.6	53.4%
	148	生活機能 I かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能 II	≧ 41.2	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	52.4%
	149	生活機能 II	≧ 19.6	かつ 生活機能 II	≦ 42.6	かつ 1人で出たがる	= 0.0	かつ 反復的行動	≧ 4.1	かつ 自己の過大評価	= 0.0	かつ 生活障害評価 社会的適応	= 5.0	80.6%
	150	生活機能 I	≧ 34.6	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	かつ 衣服の着脱	= 0.0	66.7%
	151	生活機能 I	≧ 34.6	かつ 生活機能 II	≧ 23.6	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	かつ 入浴	≦ 6.1	60.9%
	152	生活機能 II	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 21.0	かつ 調理	≧ 9.4	かつ 感情が不安定	≧ 2.1	かつ 二軸評価 能力障害	= 5.0	100.0%
	153	生活機能 II かつ 生活障害評価 社会的適応	≧ 19.6 = 5.0	かつ 生活機能 II	≦ 42.6	かつ 認知機能	≧ 43.8	かつ 認知機能	≦ 85.4	かつ 反復的行動	≧ 4.1	かつ 自己の過大評価	= 0.0	80.6%
154	生活機能 I かつ 生活障害評価 生活リズム	≧ 21.1 ≧ 4.0	かつ 生活機能 II	≧ 34.9	かつ 生活機能 II	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≦ 6.6	60.0%	
155	生活機能 I かつ 衣服の着脱	≧ 37.6 = 0.0	かつ 生活機能 I かつ 生活障害評価 社会的適応	≦ 59.9 ≦ 3.0	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 64.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 40.3	かつ 移乗	≦ 6.6	60.0%	
156	生活機能 I かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 37.6 ≦ 36.6	かつ 生活機能 I かつ 移乗	≦ 42.0 ≧ 10.7	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 74.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5	75.0%	
	157	生活機能 I	≦ 37.5	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 74.0	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 45.2					59.8%
	158	生活機能 I	≧ 60.0	かつ 生活機能 II	≧ 50.7	かつ 生活機能 II	≦ 70.9	かつ 食事	≦ 14.4					56.1%
	159	生活機能 I	≦ 42.0	かつ 生活機能 II	≧ 78.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ 食事	≦ 14.4	かつ 他人を傷つける行為	= 0.0			66.7%

160	生活機能 I	≧ 34.6	かつ	生活機能 II	≧ 23.6	かつ	生活機能 II	≦ 50.6	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	51.7%									
161	生活機能 I	≧ 40.4	かつ	生活機能 II	≧ 23.6	かつ	生活機能 II	≦ 50.6	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 30.3	かつ	調理	≧ 20.2	47.6%									
162	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 78.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	≧ 3.5	46.4%									
163	生活機能 I	≧ 60.0	かつ	生活機能 II	≧ 71.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	不安定な行動	≦ 3.5	74.1%						
164	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 74.1	かつ	生活機能 II	≦ 78.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	42.1%						
165	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 74.1	かつ	生活機能 II	≦ 78.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≦ 14.4	69.8%						
166	生活機能 I	≧ 42.1	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 88.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	= 0.0	59.7%						
167	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 42.0	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	55.6%						
168	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 36.7	かつ	移乗	≧ 10.7	48.5%						
169	生活機能 I	≧ 42.1	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 78.2	かつ	生活機能 II	≦ 88.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	= 0.0	76.3%			
170	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (B群)	≦ 59.2	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0	69.9%			
171	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 64.3	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0	65.1%			
172	生活機能 I	≧ 42.1	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≧ 23.9	63.6%			
173	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 64.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0	47.4%			
174	生活機能 I	≧ 42.1	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮 膝関節	≧ 17.2	86.5%
175	生活機能 I	≧ 42.1	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮 膝関節	= 0.0	66.7%
176	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	認知機能	≦ 65.7	かつ	行動上の障害 (B群)	≧ 59.3	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0	60.4%
177	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	麻痺	≧ 8.2	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0	55.0%
178	生活機能 I	≧ 37.6	かつ	生活機能 I	≦ 59.9	かつ	生活機能 II	≧ 50.7	かつ	生活機能 II	≦ 74.0	かつ	認知機能	≧ 65.8	かつ	行動上の障害 (B群)	≧ 59.3	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0	47.7%
179	生活機能 I	≧ 40.1	かつ	生活機能 I	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺 左下肢	= 4.0													81.8%
180	生活機能 I	≧ 40.1	かつ	生活機能 I	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺 右下肢	= 4.0													81.8%
181	生活機能 I	≧ 40.1	かつ	生活機能 I	≦ 61.1	かつ	麻痺 その他	≧ 2.0	かつ	関節の拘縮 股関節	= 18.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 3.0										90.3%
182	生活機能 I	≧ 40.1	かつ	生活機能 I	≦ 61.1	かつ	交通手段の利用	= 18.9	かつ	関節の拘縮 股関節	= 18.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 3.0										88.2%
183	生活機能 II	≧ 42.7	かつ	生活機能 II	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	買い物	= 19.5										86.5%
184	生活機能 II	≧ 42.7	かつ	生活機能 II	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺 右下肢	≧ 2.0										82.4%
185	生活機能 II	≧ 42.7	かつ	生活機能 II	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺 左下肢	≧ 2.0										82.4%
186	生活機能 II	≧ 42.7	かつ	生活機能 II	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	排尿	= 20.1										80.0%
187	生活機能 I	≧ 60.0	かつ	生活機能 II	≧ 71.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	掃除	= 6.7	かつ	不安定な行動	≦ 3.5				100.0%
188	生活機能 I	≧ 60.0	かつ	生活機能 II	≧ 71.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 50.6	かつ	麻痺・拘縮	= 0.0	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	不安定な行動	≦ 3.5				64.1%

	189	生活機能Ⅰ かつ 不安定な行動	≥ 60.0 ≤ 3.5	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 薬の管理	= 3.3	90.0%
	190	生活機能Ⅰ かつ 不安定な行動	≥ 60.0 ≤ 3.5	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 説明の理解	= 0.0	83.3%
	191	生活機能Ⅰ かつ 自らを傷つける行為	≥ 60.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 不安定な行動	≤ 3.5	71.7%
	192	生活機能Ⅰ かつ 食事	≥ 37.6 = 23.9	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≤ 4.9	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 移乗	≤ 6.6	60.0%
	193	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≥ 37.6 ≤ 6.6	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≤ 4.9	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 48.1	65.0%
六	194	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 50.7	かつ 食事	≥ 23.9							96.8%
	195	生活機能Ⅰ	≤ 59.9	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 74.1	かつ 食事	≥ 23.9							54.6%
	196	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 50.7	かつ 食事	≤ 14.4					84.0%
	197	生活機能Ⅰ	≤ 59.9	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 74.1	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 44.5	かつ 食事	≤ 14.4					59.1%
	198	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≥ 10.7	かつ 食事	≤ 14.4			68.7%
	199	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 不安定な行動	≥ 6.3	53.1%
	200	食事	= 23.9	かつ 二軸評価 精神症状	= 4.0									98.5%
	201	食事	= 23.9	かつ 1人で出たがる	≥ 6.1									100.0%
	202	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 その他	= 12.7									98.0%
	203	食事	= 23.9	かつ 視力	= 2.8									98.5%
	204	食事	= 23.9	かつ 大声・奇声を出す	= 6.0									100.0%
	205	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 股関節 左	= 2.0									98.0%
	206	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 股関節 右	= 2.0									98.0%
	207	認知機能	≥ 85.5	かつ 特別な医療	≥ 10.3									99.2%
	208	説明の理解	= 15.3	かつ 気管切開の処置	= 14.9									100.0%
	209	気管切開の処置	= 14.9	かつ 麻痺 左上肢	= 4.0									100.0%
210	気管切開の処置	= 14.9	かつ 麻痺 右上肢	= 4.0									100.0%	
211	生活機能Ⅰ	≥ 61.2	かつ レスピレーター	= 16.9									100.0%	
212	座位保持	= 15.9	かつ 衣服の着脱	= 18.2	かつ てんかん	≥ 1.0							95.0%	
213	座位保持	= 15.9	かつ 移乗	= 15.9	かつ てんかん	≥ 1.0							95.0%	
214	食事	= 23.9	かつ 視力	≥ 25.5	かつ 視力	≤ 28.3							98.7%	
215	生活機能Ⅱ	≥ 69.3	かつ てんかん	≥ 1.0	かつ 生活障害評価 生活リズム	= 5.0							85.7%	
216	生活機能Ⅰ かつ 衣服の着脱	≥ 37.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≥ 8.2	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 移乗	≤ 6.6	100.0%	

注1 条件の欄中、起居動作、生活機能Ⅰ、生活機能Ⅱ、視聴覚機能、応用日常生活動作、認知機能、行動上の障害（A群）、行動上の障害（B群）、行動上の障害（C群）、特別な医療及び麻痺・拘縮に係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各群の合計点数をいう。

2 条件の欄中、注1に掲げる事項以外のものに係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各項目の点数をいう。